

● Catégories de notation ●

- **Catégorie 1 :** **Ce patient peut être contrôlé avec le schéma thérapeutique actuel.** Continuez à surveiller ce patient selon le meilleur traitement médical et de votre jugement professionnel/directives cliniques.
- **Catégorie 2 :** **Il semble que ce patient ne soit pas contrôlé avec le schéma thérapeutique actuel.** Cependant, des avantages supplémentaires peuvent être obtenus en optimisant davantage le traitement. Les thérapies assistées par dispositif médical peuvent ne pas être nécessaires pour le moment. Cependant, utilisez les antécédents médicaux de votre patient, la préférence de traitement et votre meilleur jugement médical pour lui recommander un traitement.
- **Catégorie 3 :** **Ce patient ne semble pas être contrôlé avec le schéma thérapeutique actuel et pourrait bénéficier d'une thérapie assistée par dispositif médical.** Nous vous suggérons d'évaluer l'éligibilité à une thérapie assistée par dispositif médical en fonction des antécédents médicaux du patient, de la préférences de traitement et de votre meilleur jugement médical pour lui recommander un traitement.

Notation Section 1

Dépistage de contrôle inadéquat avec les médicaments oraux

- Prises de lévodopa par voie orale ≥ 5 fois/jour
- ≥ 2 heures de périodes OFF/jour
- Présence de fluctuations motrices imprévisibles
- Présence de dyskinésies invalidantes
- Limitation d'au moins une activité de la vie quotidienne

Si la réponse est **NON** à **TOUTES** les questions de la Section 1, le patient est classé dans la [Catégorie 1](#)

Si la réponse est **OUI** à au moins une des questions de la Section 1, le questionnaire continue à la **Section 2**

Notation Section 2

Notation de fréquence

- 0 Jamais
- 1 Rarement
- 2 Parfois/souvent
- 3 La plupart du temps/tout le temps

Notation de sévérité

- 1 Légère
- 2 Modérée
- 3 Sévère

Niveau d'indépendance (activités de la vie quotidienne)

- 0 Autonome pour toutes les activités
- 1 Autonome pour la plupart des activités
- 2 Besoin d'aide/dépendant pour certaines activités
- 3 Totalement dépendant pour toutes les activités

Chutes par mois

- 0 0
- 1 1
- 2 2 ou plus

- Si une dose de lévodopa ≤ 3 prises est sélectionnée **ET** « Oui » est sélectionné à au moins une des autres questions de la **Section 1** (par exemple ≥ 2 heures périodes OFF/jour, présence de fluctuations motrices imprévisibles, présence de dyskinesies invalidantes, limitations d'activités de la vie quotidienne), le patient sera classé dans la [Catégorie 2](#), quelles que soient la fréquence et la sévérité des symptômes.
- Si une dose de lévodopa ≥ 4 prises est sélectionnée **ET** « Oui » est sélectionné à au moins une des autres questions de la **Section 1** (par exemple ≥ 2 heures périodes OFF/jour, présence de fluctuations motrices imprévisibles, présence de dyskinesies invalidantes, limitations d'activités de la vie quotidienne), alors veuillez-vous référer à l'algorithme de la page suivante pour la classification des catégories.

≥4 doses de lévodopa et :

Score total (Fréquence x sévérité) ≥3 pour :

- Fluctuations motrices imprévisibles*
- Symptômes non moteurs en périodes OFF
- Freezing de la marche en périodes OFF
- Hallucinations/psychoses sans raison apparente

Catégorie

3

Score total (Fréquence x sévérité) <3 pour :

- Fluctuations motrices imprévisibles*
- Symptômes non moteurs en périodes OFF
- Freezing de la marche en périodes OFF
- Hallucinations/psychose sans raison apparente

Catégorie

2

Un score de sévérité 2 ou 3 pour :

- Périodes OFF*
- Dyskinésies invalidantes*
- Déficit d'activités de la vie quotidienne*

Catégorie

3

*Ces questions seront ignorées dans la Section 2 si la réponse dans la Section 1 est **non**.

≥4 doses de lévodopa et :

Un score de sévérité <u>2</u> pour :

- Périodes OFF*
- Dyskinésies invalidantes*
- Déficit d'activités de la vie quotidienne*

Catégorie

2

Un score de 1 ou 2 pour :

- Chutes

Catégorie

3

Un score de 0 pour :

- Chutes

Catégorie

2

*Ces questions seront ignorées dans la Section 2 si la réponse dans la Section 1 est **non**.

- **Veillez noter :** les scores pour « dystonie douloureuse » et « trouble du contrôle des impulsions » ont été fournis pour votre information afin que vous puissiez considérer ces domaines lors de l'évaluation de votre patient pour des recommandations de traitement. Ces scores de sévérité et de fréquence n'affectent pas le résultat de l'outil.