

Scoringskategorier

- **Kategori 1:** Patienten er formentlig velkontrolleret med det nuværende behandlingsregime. Vurder fortsat patienten baseret på den bedste medicinske behandling og din faglige vurdering/de kliniske retningslinjer.
- **Kategori 2:** Patienten er formentlig ikke velkontrolleret med det nuværende behandlingsregime, dog kan det være muligt at optimere behandlingen yderligere. Avanceret behandling er formentlig ikke nødvendigt på nuværende tidspunkt. Anbefal en behandling baseret på patientens sygehistorie, behandlingspræference og din bedste lægelige vurdering.
- **Kategori 3:** Patienten er formentlig ikke velkontrolleret med det nuværende behandlingsregime, og patienten kan muligvis have gavn af avanceret behandling. Du bør vurdere patientens egnethed til at få avanceret behandling og anbefale en behandling baseret på patientens sygehistorie, behandlingspræference og din bedste lægelige vurdering.

• Sektion 1 – Scoring •

Screening for utilstrækkelig kontrol på nuværende tabletbehandling

- Tager peroral levodopa ≥ 5 gange/dag
- ≥ 2 timers off-tid/dag
- Tilstedeværelse af uforudsigelige motoriske fluktuationer
- Tilstedeværelse af generende dyskinesier
- Begrænsninger i ≥ 1 dagligdagsaktiviteter

Hvis der svares **NEJ** til **ALLE** spørgsmålene i Sektion 1, tilhører patienten [Kategori 1](#)

Hvis der svares **JA** til mindst **ET** af spørgsmålene i Sektion 1, fortsættes til **Sektion 2**

Sektion 2 – Scoring

Score for hyppighed

- 0 Aldrig
- 1 Sjældent
- 2 Indimellem
- 3 Det meste af tiden/hele tiden

Score for sværhedsgrad

- 1 Mild
- 2 Moderat
- 3 Svær

Uafhængighedsniveau (Dagligdagsaktiviteter)

- 0 Uafhængig i alle aktiviteter
- 1 Uafhængig i de fleste aktiviteter
- 2 Brug for assistance/afhængig i nogle aktiviteter
- 3 Fuldstændigt afhængig i alle aktiviteter

Fald pr. måned

- 0 Ingen fald
- 1 1
- 2 2 eller flere

- Hvis der i **Sektion 1** er valgt levodopa-dosering ≤ 3 , **OG** hvis der er svaret "JA" til mindst **ET** af de andre punkter (f.eks. ≥ 2 timers off-tid/dag, tilstedeværelse af uforudsigelige motoriske fluktuationer, tilstedeværelse af generende dyskinesier, begrænsninger i dagligdagsaktiviteter), tilhører patienten [Kategori 2](#), uanset hvor hyppige/svære symptomerne er.
- Hvis der er svaret "Ja" til mindst **ET** af punkterne (f.eks. ≥ 2 timers off-tid/dag, tilstedeværelse af uforudsigelige motoriske fluktuationer, tilstedeværelse af generende dyskinesier, begrænsninger i dagligdagsaktiviteter) i Sektion 1, **OG** hvis der er valgt levodopa-dosering ≥ 4 , henvises til algoritmen for kategoritildeling på næste side.

≥ 4 doser levodopa og:

(Hyppighed x sværhedsgrad) score på ≥ 3 for:

- Uforudsigelige motoriske fluktuationer*
- Ikke-motoriske off-symptomer
- Fastfrysning under gang i off-perioder
- Hallucinationer/psykose uden sygdomsindsigt

Kategori

3

(Hyppighed x sværhedsgrad) score på < 3 for:

- Uforudsigelige motoriske fluktuationer*
- Ikke-motoriske off-symptomer
- Fastfrysning under gang i off-perioder
- Hallucinationer/psykose uden sygdomsindsigt

Kategori

2

En score på 2 eller 3 for:

- Off-perioder*
- Generende dyskinesier*
- Nedsat evne til at gennemføre dagligdagsaktiviteter*

Kategori

3

*Disse spørgsmål springes over i Sektion 2, hvis svaret i Sektion 1 er **Nej**.

≥ 4 doser levodopa og:

En score på < 2 for:

- Off-perioder*
- Generende dyskinesier*
- Nedsat evne til at gennemføre dagligdagsaktiviteter*

Kategori

2

En score på 1 eller 2 for:

- Fald

Kategori

3

En score på 0 for:

- Fald

Kategori

2

*Disse spørgsmål springes over i Sektion 2, hvis svaret i Sektion 1 er **Nej**.

- **Bemærk:** Scorerne for “**dystoni med Smerter**” og “**impulskontrolforstyrrelser**” er anført til orientering, så du kan tage hensyn til disse symptomområder, når du skal vurdere patienten og anbefale en behandling. Sværhedsgraden og hyppigheden for disse scorer har ingen betydning for redskabets resultater.