

Patientens ID:

Patientens alder:

Patientens initialer:

Dato:

INSTRUKTIONER

Making Informed Decisions to Aid Timely Management of Parkinson's Disease (MANAGE-PD) er et screeningsværktøj beregnet til at blive brugt af sundhedspersoner. Dette værktøj sigter mod at understøtte sundhedspersoner i beslutningstagning om rettidig håndtering af symptomer på Parkinsons sygdom (PD) baseret på en omfattende evaluering af hyppigheden og sværhedsgraden af de motoriske, ikke-motoriske og funktionelle symptomer.

Dette spørgeskema består af to dele: Afsnit 1 og Afsnit 2. Symptomer skal vurderes på baggrund af den foregående måned.

Dette værktøj giver ikke vejledning om typen af avanceret behandling, men giver en indikation af, at denne type behandling kan overvejes.

EFTER AFSLUTNING AF DE RELEVANTE DELE VIL PATIENTEN BLIVE KATEGORISERET I EN AF TRE KATEGORIER

1

KATEGORI 1

Patienten er formentlig velkontrolleret med det nuværende behandlingsregime. Overvåg fortsat patienten baseret på den bedste medicinske behandling og din faglige vurdering/de kliniske retningslinjer.

2

KATEGORI 2

Patienten er formentlig ikke velkontrolleret med det nuværende behandlingsregime, dog kan det være muligt at optimere behandlingen yderligere. **Avanceret behandling er formentlig ikke nødvendigt på nuværende tidspunkt.** Anbefal en behandling baseret på patientens sygehistorie, behandlingspræference og din bedste lægelige vurdering.

3

KATEGORI 3

Patienten er formentlig ikke velkontrolleret med det nuværende behandlingsregime, og patienten kan muligvis have gavn af avanceret behandling. Du bør vurdere patientens egnethed til at få avanceret behandling og anbefale en behandling baseret på patientens sygehistorie, behandlingspræference og din bedste lægelige vurdering.

AFSNIT 1

Dette afsnit giver dig mulighed for at screene, hvilke patienter med Parkinsons sygdom, der ikke er velkontrollerede på det nuværende behandlingsregime.

Start med at udfylde de fem spørgsmål (**JA** eller **NEJ**). Hvis svaret er **NEJ** til **ALLE** spørgsmål i afsnit 1, klassificeres patienten som **Kategori 1** (se ovenfor for at få forklaring på denne kategori). Hvis der svares **JA** til et eller flere spørgsmål i Afsnit 1, skal du følge vejledningen i hvert tilfælde.

Kontrollér det passende svar for hvert spørgsmål og sæt **X**.

1. Hvor mange daglige doser levodopa rapporterer patienten, at han/hun tager?	☐ ≤3 doser	☐ 4 doser	☐ ≥5 doser
2. Oplever patienten dagligt ≥ 2 timers samlet off-tid?	☐ NEJ	☐ JA	☐ NEJ
3. Oplever patienten uforudsigelige motoriske fluktuationer på sin nuværende tabletbehandling?	☐ NEJ	☐ JA	☐ NEJ
4. Oplever patienten generende dyskinesier (ufrivillige, choreatiske bevægelser) på sin nuværende tabletbehandling?	☐ NEJ	☐ JA	☐ NEJ
5. Oplever patienten i øjeblikket begrænsninger i forhold til at udføre en eller flere dagligdags aktiviteter (f.eks. skrive, gå, bade, tage tøj på, spise, gå på toilettet osv.)?	☐ NEJ	☐ JA	☐ NEJ
Hvis der svares NEJ til ALLE spørgsmålene i Afsnit 1, tilhører patienten KATEGORI 1		Hvis der er svaret JA til mindst ET af spørgsmålene tilhører patienten KATEGORI 2	
Hvis der svares NEJ til ALLE spørgsmålene i Afsnit 1, tilhører patienten KATEGORI 1		Hvis der svares JA til mindst ET af spørgsmålene i Afsnit 1, fortsættes til AFSNIT 2 NÆSTE SIDE >>	
Patienter på ≥ 5 doser af levodopa bør vurderes yderligere. Udfyld AFSNIT 2 NÆSTE SIDE >>			

Dette afsnit vurderer hyppigheden og sværhedsgraden af flere nøglesymptomer. Hvis svaret på nedenstående spørgsmål er ukendt, kan du antage, at patienten ikke oplever symptomet og bedømme det som nul.

AFSNIT 2 SCORING:

• Score for hyppighed: 0= Aldrig, 1= Sjældent (≤1/uge), 2= Indimellem (flere gange ugentligt), 3= Det meste af tiden/hele tiden (dagligt).

• Score for sværhedsgrad: 1= Mild, 2= Moderat, 3= Svær.

• Uafhængighedsniveau (dagligdags aktiviteter): 0= Uafhængig i alle aktiviteter, 1= Uafhængig i de fleste aktiviteter, 2= Brug for assistance/afhængig i nogle aktiviteter, 3= Fuldstændigt afhængig i alle aktiviteter.

• Fald pr. måned: 0= Ingen fald, 1= 1 fald, 2= 2 eller flere fald.

DEN SAMLEDE BEREGNING for hvert spørgsmål opnås ved multiplikation af hyppighed og sværhedsgrad (hyppighed X sværhedsgrad).

RESULTATFORTOLKNING: Den højeste kategori opnået på ethvert individuelt spørgsmål bør være den, der bruges til patientkategorisering. Se vejledning inkluderet i bunden af hvert sæt spørgsmål.

Bemærk: Scorene for “dystoni med smerter” og “impulskontrolforstyrrelser” er anført til orientering, så du kan tage hensyn til disse symptomområder, når du skal vurdere patienten og anbefale en behandling. Sværhedsgraden og hyppigheden for disse scorer har ingen betydning for værktøjets resultater.

Kontrollér det passende svar for hvert spørgsmål og sæt X

MOTORISKE FLUKTUATIONER

Hvor ofte er de motoriske fluktuationer uforudsigelige?

0

Aldrig

1

Sjældent

2

Indimellem

3

Det meste af tiden/
hele tiden

Hvor svære/generende er de motoriske fluktuationer?

1

Milde

2

Moderate

3

Svære

TOTAL SCORE

(Hyppighed X Sværhedsgrad)

FASTFRYSNING UNDER GANG

Hvor ofte oplever patienten fastfrysning under gang i off-perioder?

0

Aldrig

1

Sjældent

2

Indimellem

3

Det meste af tiden/
hele tiden

Hvor svære/generende er episoderne med fastfrysning under gang i off-perioder?

1

Milde

2

Moderate

3

Svære

TOTAL SCORE

(Hyppighed X Sværhedsgrad)

IKKE-MOTORISKE SYMPTOMER

Hvor ofte oplever patienten ikke-motoriske off-symptomer (f.eks. angst, smerter, humørsvingninger, søvnproblemer osv.)?

0

Aldrig

1

Sjældent

2

Indimellem

3

Det meste af tiden/
hele tiden

Hvor svære/generende er de ikke-motoriske off-symptomer?

1

Milde

2

Moderate

3

Svære

TOTAL SCORE

(Hyppighed X Sværhedsgrad)

HALLUCINATIONER/PSYKOSE

Hvor ofte oplever patienten hallucinationer/psykose uden sygdomsindsigt?

0

Aldrig

1

Sjældent

2

Indimellem

3

Det meste af tiden/
hele tiden

Hvor svære/generende er episoderne med hallucinationer/psykose uden sygdomsindsigt?

1

Milde

2

Moderate

3

Svære

TOTAL SCORE

(Hyppighed X Sværhedsgrad)

HVIS DEN TOTALE SCORE TIL ET AF SPØRGSMÅLENE ER 3 ELLER MERE = KATEGORI 3. ALLE ANDRE ER KATEGORI 2

OFF-PERIODER

Hvor svære/generende er off-perioderne hos patienten på den nuværende tabletbehandling?

1

Milde

2

Moderate

3

Svære

TOTAL SCORE

DYSKINESI

Hvor ofte oplever patienten generende dyskinesier?

0

Aldrig

1

Sjældent

2

Indimellem

3

Det meste af tiden/
hele tiden

TOTAL SCORE

NEDSAT EVNE TIL AT UDFØRE DAGLIGDAGS AKTIVITETER

Hvilket assistance-eller støtteniveau har patienten brug for til at udføre en eller flere af sine dagligdags aktiviteter (f.eks. gå, bade, tage tøj på, spise, gå på toilettet osv.)?

0

Uafhængig i alle aktiviteter

1

Uafhængig i de fleste aktiviteter

2

Har brug for assistance/
er afhængig i nogle aktiviteter

3

Fuldstændigt afhængig i alle aktiviteter

TOTAL SCORE

HVIS DEN TOTALE SCORE TIL ET AF SPØRGSMÅLENE ER 2 ELLER 3 = KATEGORI 3. ALLE ANDRE ER KATEGORI 2

FALD

Hvor ofte er patienten faldet i den seneste måned?

0

fald

1

fald

2

eller flere fald

TOTAL SCORE

HVIS SCOREN ER 1 ELLER 2 = KATEGORI 3. ALLE ANDRE ER KATEGORI 2

DYSTONI

Hvor ofte oplever patienten dystoni med smerter?

0

Aldrig

1

Sjældent

2

Indimellem

3

Det meste af tiden/
hele tiden

Hvor svær/generende er dystonien med smerter?

1

Milde

2

Moderate

3

Svære

TOTAL SCORE

(Hyppighed X Sværhedsgrad)

IMPULSKONTROLFORSTYRRELSE

Hvor ofte oplever patienten impulskontrolforstyrrelser?

0

Aldrig

1

Sjældent

2

Indimellem

3

Det meste af tiden/
hele tiden

Hvor svær/generende er indvirkningen af impulskontrolforstyrrelser?

1

Milde

2

Moderate

3

Svære

TOTAL SCORE

(Hyppighed X Sværhedsgrad)

TIL INFORMATIVE FORMÅL

ABBV-DK-0002-FM (v2.0); Marts 2025