• Catégories de résultats •

- **Catégorie 1 :** Le patient semble contrôlé avec le traitement actuel. Continuez de surveiller le patient en vous basant sur le meilleur traitement médical, ainsi que sur votre jugement professionnel et les recommandations cliniques.
- **Catégorie 2 :** Le patient semble mal contrôlé avec le traitement actuel. Une optimisation du traitement pourrait toutefois apporter des bénéfices supplémentaires. Le recours à un traitement de seconde ligne ne semble pas justifié à l'heure actuelle. Toutefois, tenez compte des antécédents médicaux du patient, de ses préférences en termes de traitement et de votre jugement médical pour déterminer le traitement recommandé.
- **Catégorie 3 :** Le patient semble mal contrôlé avec le traitement actuel. Nous vous suggérons d'évaluer si le patient pourrait être éligible à un traitement de seconde ligne. Pour cela, tenez compte des antécédents du patient, de ses préférences en termes de traitement et de votre jugement médical.

Cotation de la Section 1

Questions visant à déterminer si le patient est mal contrôlé avec son traitement oral actuel

- ≥ 5 prises/jour de lévodopa par voie orale
- ≥ 2 heures/jour de périodes « OFF »
- Présence de fluctuations motrices imprévisibles
- Présence de dyskinésies gênantes
- Capacité limitée à réaliser ≥ 1 activité de la vie quotidienne

Si la réponse est **NON** à **TOUTES** les questions de la Section 1, le patient entre dans la [Catégorie 1](#)

Si la réponse est **OUI** à **N'IMPORTE QUELLE** question de la Section 1, passer à la **Section 2**

Cotation de la section 2

Score de fréquence

- 0 Jamais
- 1 Rarement
- 2 Parfois/Souvent
- 3 La plupart du temps/En permanence

Score de sévérité

- 1 Légère
- 2 Modérée
- 3 Sévère

Degré d'autonomie (activités de la vie quotidienne)

- 0 Autonome pour toutes les activités
- 1 Autonome pour la plupart des activités
- 2 A besoin d'aide/dépendant pour certaines activités
- 3 Totalement dépendant pour toutes les activités

Chutes au cours des 30 derniers jours

- 0 0
- 1 1
- 2 2 ou plus

- Si, à la section 1, le nombre de prises de lévodopa est ≤ 3 ET que la réponse « Oui » est sélectionnée pour N'IMPORTE QUELLE autre catégorie (p. ex., durée des périodes « OFF » ≥ 2 heures/jour, présence de fluctuations motrices imprévisibles, présence de dyskinésies gênantes, capacité limitée à réaliser les activités de la vie quotidienne), le patient entre dans la [Catégorie 2](#), quelles que soient la fréquence et la sévérité des symptômes.
- Si la réponse « Oui » est sélectionnée pour N'IMPORTE QUELLE catégorie (p. ex., durée des périodes « OFF » ≥ 2 heures/jour, présence de fluctuations motrices imprévisibles, présence de dyskinésies gênantes, capacité limitée à réaliser les activités de la vie quotidienne) à la Section 1, ET que le nombre de prises de lévodopa est ≥ 4 , se référer à l'algorithme en page suivante pour la définition des catégories.

≥ 4 prises de lévodopa et :

Score (fréquence x sévérité) ≥ 3 pour :

- Fluctuations motrices imprévisibles*
- Symptômes non moteurs pendant les périodes « OFF »
- Freezing pendant les périodes « OFF »
- Hallucinations/Psychose sans *insight*

Catégorie

3

Score (fréquence x sévérité) < 3 pour :

- Fluctuations motrices imprévisibles*
- Symptômes non moteurs pendant les périodes « OFF »
- Freezing pendant les périodes « OFF »
- Hallucinations/Psychose sans *insight*

Catégorie

2

Score de 2 ou 3 pour :

- Périodes « OFF »*
- Dyskinésies gênantes*
- Retentissement sur la réalisation des AVQ*

Catégorie

3

*Il n'est pas nécessaire de répondre à ces questions de la Section 2 si la réponse à la Section 1 est « **Non** ».

≥ 4 prises de lévodopa et :

Score < 2 pour :

- Périodes « OFF »*
- Dyskinésies gênantes*
- Retentissement sur la réalisation des AVQ*

Catégorie

2

Score de 1 ou 2 pour :

- Chutes

Catégorie

3

Score de 0 pour :

- Chutes

Catégorie

2

*Il n'est pas nécessaire de répondre à ces questions de la Section 2 si la réponse à la Section 1 est « Non ».

- **Remarque :** Les scores pour les dystonies douloureuses et les troubles du contrôle des impulsions sont fournis à titre informatif afin que vous puissiez tenir compte de ces domaines pour déterminer le traitement recommandé pour votre patient. Les scores de sévérité et de fréquence de ces domaines n'ont pas d'incidence sur le résultat obtenu avec cet outil.