

### • Catégories de notation •

- **Catégorie 1 :** Le patient semble contrôlé avec le traitement actuel. Continuez de surveiller le patient en vous basant sur le meilleur traitement médical le plus adapté et sur votre jugement professionnel et les recommandations cliniques.
- **Catégorie 2 :** Le patient semble mal contrôlé avec le traitement actuel. Une optimisation du traitement pourrait toutefois apporter des bénéfices supplémentaires. Le recours à un traitement de seconde ligne ne semble pas justifié à l'heure actuelle. Toutefois, tenez compte des antécédents médicaux du patient, de ses préférences en termes de traitement et de votre jugement médical pour déterminer le traitement recommandé.
- **Catégorie 3 :** Le patient semble mal contrôlé avec le traitement actuel et pourrait tirer des bénéfices d'un traitement de seconde ligne. Nous vous suggérons d'évaluer si le patient pourrait être candidat à un traitement de seconde ligne. Pour déterminer le traitement recommandé, tenez compte des antécédents du patient, de ses préférences en termes de traitement et de votre jugement médical.

### Notation Section 1

#### Dépistage de contrôle inadéquat avec les médicaments oraux

- Prendre de la lévodopa par voie orale  $\geq 5$  prises/jour
- $\geq 2$  heures de période OFF/jour
- Présence de fluctuations motrices imprévisibles
- Présence de dyskinésie gênante
- Limitations dans  $\geq 1$  activités de la vie quotidienne

Si la réponse est **NON** à **TOUTES** les questions de la Section 1, le patient est classé dans la [Catégorie 1](#)

Si la réponse est **OUI** sur au minimum **UNE des questions** de la Section 1, le patient passe à la **Section 2**

### Notation 2 Section 2

#### Notation de fréquence

- 0 Jamais
- 1 Rarement ( $\leq 1$ /semaine)
- 2 Parfois (quelques fois par semaine)
- 3 Très souvent/en permanence (tous les jours)

#### Score de sévérité

- 1 Légère
- 2 Modérée
- 3 Sévère

#### Niveau d'indépendance (activité de la vie quotidienne)

- 0 Autonome pour toutes les activités
- 1 Autonome pour la plupart des activités
- 2 Besoin d'aide/dépendant pour certaines activités
- 3 Totalement dépendant pour toutes les activités

#### Chutes par mois

- 0 0 chute
- 1 1
- 2 2 ou plus

- Si dans la **Section 1**, une dose de lévodopa  $\leq 3$  a été sélectionnée **ET** « Oui » a été sélectionnée pour **N'IMPORTE QUELLES** autre catégorie (par exemple  $\geq 2$  heures période OFF/jour, présence de fluctuations motrices imprévisibles, présence de dyskinésie gênante, limitations dans les activités de la vie quotidienne), le patient sera classé dans la [Catégorie 2](#), quelle que soit la fréquence/sévérité des symptômes.
- Si « Oui » a été sélectionnée sur **au minimal une des catégories** de la **Section 1** (par exemple  $\geq 2$  heures période OFF/jour, présence de fluctuations motrices imprévisibles, présence de dyskinésie gênante, limitation dans les activités de la vie quotidienne) dans la Section 1, **ET** une dose lévodopa est  $\geq 4$ , a été sélectionnée, veuillez vous référer à l'algorithme en page suivante pour la classification des catégories.

≥ 4 doses de lévodopa et :

(Fréquence x Sévérité) score ≥ 3 pour :

- Fluctuations motrices imprévisibles\*
- Symptômes non moteurs pendant les périodes OFF
- Freezing of gait pendant les périodes OFF
- Hallucinations/psychoses sans *insight*

Catégorie

3

(Fréquence x Sévérité) score < 3 pour :

- Fluctuations motrices imprévisibles\*
- Symptômes non moteurs pendant les périodes OFF
- Freezing of gait pendant les périodes OFF
- Hallucinations/psychose sans *insight*

Catégorie

2

Un score de 2 ou 3 pour :

- Périodes OFF\*
- Dyskinésies gênantes\*
- Retentissement sur les activités de la vie quotidienne\*

Catégorie

3

\*Ces questions seront ignorées dans la Section 2 si la réponse dans la Section 1 est **non**.

### ≥ 4 doses de lévodopa et :

#### Un score < 2 pour :

- Périodes OFF\*
- Dyskinésies gênantes\*
- Retentissement sur les activités de la vie quotidienne\*

Catégorie

2

#### Un score de 1 ou 2 pour :

- Chutes

Catégorie

3

#### Un score de 0 pour :

- Chutes

Catégorie

2

\*Ces questions seront ignorées dans la Section 2 si la réponse dans la Section 1 est **non**.

- **Veillez noter :** Les scores pour les « dystonies douloureuses » et « troubles du contrôle des impulsions » ont été fournis pour votre information afin que vous puissiez considérer ces domaines lors de l'évaluation de votre patient pour des recommandations de traitement. La sévérité et la fréquence des scores n'affectent pas le résultat de l'outil.