

Poängkategorier

- **Kategori 1:** Uppgifterna du angivit tyder på att patienten har adekvat symtomkontroll med nuvarande behandling. Fortsätt att monitorera patienten enligt kliniska riktlinjer samt din professionella bedömning.
- **Kategori 2:** Uppgifterna du angivit tyder på att patienten kan få bättre effekt om behandlingen optimeras. Vid denna tidpunkt kanske det inte är aktuellt med pump- eller DBS-behandling men beakta patientens anamnes och behandlingspreferens samt medicinsk bedömning vid behandlingsrekommendation.
- **Kategori 3:** Uppgifterna du angivit tyder på att patienten inte har adekvat symtomkontroll med nuvarande behandling och skulle kunna ha nytta av pump- eller DBS-behandling. Detta bör utredas vidare genom en mer utförlig medicinsk bedömning där även patientens behandlingspreferens tas i beaktning.

Poäng för Avsnitt 1

Screening för inadekvat symtomkontroll med nuvarande perorala läkemedel

- Tar peroral levodopa \geq 5 gånger/dag
- \geq 2 timmar tid i OFF/dag
- Förekomst av oförutsägbara motoriska fluktuationer
- Förekomst av besvärande dyskinesier
- Begränsningar \geq 1 vid aktiviteter i det dagliga livet

Om svaret är **NEJ** på **ALLA** frågorna i Avsnitt 1 klassificeras patienten som [Kategori 1](#)

Om svaret är **JA** på **NÅGON** fråga i Avsnitt 1 fortsätter patienten till **Avsnitt 2**

Poäng för Avsnitt 2

Frekvenspoäng

- 0 Aldrig
- 1 Sällan
- 2 Ibland
- 3 Oftast/hela tiden

Svårighetsgrad

- 1 Mild
- 2 Måttlig
- 3 Svår

Nivå av beroende
(aktiviteter i det dagliga livet)

- 0 Oberoende vid alla aktiviteter
- 1 Oberoende vid de flesta aktiviteter
- 2 Behöver hjälp/stöd vid vissa aktiviteter
- 3 Helt beroende vid alla aktiviteter

Fall per månad

- 0 Inga fall
- 1 1
- 2 2 eller fler

- Om levodopa-dosintag ≤ 3 valts i **Avsnitt 1 OCH** "Ja" valts för **NÅGON** av de andra kategorierna (t.ex. ≥ 2 timmar i OFF/dag, förekomst av oförutsägbara motoriska fluktuationer, förekomst av besvärande dyskinesier, begränsningar vid aktiviteter i det dagliga livet), klassificeras patienten som [Kategori 2](#), oavsett symtomens frekvens/svårighetsgrad.
- Om "Ja" valts för **NÅGON** av kategorierna (t.ex. ≥ 2 timmar i OFF/dag, förekomst av oförutsägbara motoriska fluktuationer, förekomst av besvärande dyskinesier, begränsningar vid aktiviteter i det dagliga livet) i avsnitt 1 **OCH** levodopa-dosintag ≥ 4 valts, se algoritmen på nästa sida för klassificering av kategori.

≥ 4 dosintag av levodopa och:

(Frekvens x svårighetsgrad) poäng ≥ 3 för:

- Oförutsägbara motoriska fluktuationer*
- Icke-motoriska OFF-symptom
- Gångstopp ("freezing") under tiden i OFF
- Hallucinationer/psykos utan insikt

Kategori

3

(Frekvens x svårighetsgrad) poäng < 3 för:

- Oförutsägbara motoriska fluktuationer*
- Icke-motoriska OFF-symptom
- Gångstopp ("freezing") under tiden i OFF
- Hallucinationer/psykos utan insikt

Kategori

2

2 eller 3 poäng för:

- Perioder i OFF*
- Besvärande dyskinesier*
- Nedsättning vid aktiviteter i det dagliga livet*

Kategori

3

*Om svaret i avsnitt 1 är **nej** utesluts frågorna i avsnitt 2.

≥ 4 dosintag av levodopa och:**< 2 poäng för:**

- Perioder i OFF*
- Besvärande dyskinesier*
- Påverkan på aktiviteter i dagliga livet*

Kategori

2**1 eller 2 poäng för:**

- Fall

Kategori

3**0 poäng för:**

- Fall

Kategori

2

*Om svaret i avsnitt 1 är **nej** utesluts frågorna i avsnitt 2.

- **Observera:** Du har fått poängen för **"dystoni med smärta"** och **"störd impuls kontroll"** i informationssyfte så att du kan ta hänsyn till dessa områden när du utvärderar patienten för att ge behandlingsrekommendationer. Svårighetsgraden och frekvensen som ligger till grund för dessa poäng påverkar inte resultatet.